

Aknasit®

Uztura bagātinātājs ar cukuru un saldinātāju

200 ml

20 paciņas pa 10 ml

Aknasit® – produkts, kas satur vielas, kuras palīdz nodrošināt normālu aknu darbību.

Sastāvā esošais artišoks palīdz uzturēt gremošanu, veicina normālu aknu un zarnu trakta darbību. Pienenes saknes veicina normālu kuņģa un aknu darbību, tām piemīt prebiotiskas īpašības, kas labi ietekmē kuņģa-zarnu trakta darbību. Holīns palīdz uzturēt normālu aknu darbību, kā arī palīdz nodrošināt normālu homocisteīna un lipīdu vielmaiņu.

Sastāvdaļas: ūdens, fruktoze, holīns (holīna dihidrogēncitrāts), pieneņu sakņu (*Taraxacum officinale* Web) sausais ekstrakts (satur 2% inulīnu), inozīts, skābuma regulētājs (nātrija hidroksīds), artišķu lapu (*Gynura scolymus* L.) sausais ekstrakts, konservants (nātrija benzoāts), saldinātājs (sukraloze).

Lietošana: paciņas saturu var lietot tirā veidā vai atšķaidot 100 ml (pusglāzē) dzeramā ūdens un lietot 20 minūtes pirms ēšanas. Ieteicamais lietošanas ilgums ir 2–4 nedēļas.

Ieteicamā deva:

- bērniem no 12 gadu vecuma – 1 paciņa 1 reizi dienā;
- pusaudžiem no 14 gadu vecuma un pieaugušajiem – 1 paciņa 2 reizes dienā.

Ieteicamā diennakts deva satur:	1 paciņa (10 ml)	2 paciņas (20 ml)
Holīna dihidrogēncitrāts, kas satur:	714,3 mg	1 428,6 mg
holīnu	250 mg	500 mg
Pienenes saknes sausais ekstrakts, kas satur:	300 mg	600 mg
inulīnu	6 mg	12 mg
Inozīts	250 mg	500 mg
Artišķu lapu sausais ekstrakts	50 mg	100 mg

Lietošanas ierobežojumi: nav piemērots lietošanai bērniem vecumā līdz 12 gadiem, *grūtniecēm un sievietēm*, kas bāro bērnu ar krūti, kā arī, ja ir paaugstināta jutība pret kādu no šī uztura bagātinātāja sastāvdaļām. Nelietot žultspūšļa, žultsceļu, urīnceļu, aknu, nieru slimību, cukura diabēta, sirds mazspējas un kuņģa-zarnu trakta čūlu gadījumā.

Bridinājumi: nepārsniedz ieteicamo diennakts devu. Neizmantojiet uztura bagātinātāju pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietošanai.

Uzglabāšana: uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, sausā, tumšā vietā, temperatūrā no +8°C līdz +25°C. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā! Nelietot pēc derīguma termiņa beigām (norādīts uz iepakojuma pēc «Ieteicams līdz beigām»):».

Ražotājs: Farmaflor s.r.l., Via Donatori di Sangue 9, 12026 Piasco (CN), Itālija.

Izplatītājs: SIA Vorwarts Pharma, Krīšjāņa Barona iela 15, Rīga, LV-1011, Latvija.

Aknasit®

Maisto papildas su cukrumi ir saldikliu

200 ml

20 paketiņi po 10 ml

Aknasit® yra produkts, kurio sudėtyje yra medžiagų, padedančių palaikyti normalią kepenų veiklą.

Produkte esantys daržoviniai artiškai gali padėti palaikyti normalią kepenų, virškinimo ir žarnyno veiklą. Paprastųjų kiaušienių šaknys gali padėti palaikyti normalią virškinamojo trakto ir kepenų veiklą, jų sudėtyje yra prebiotikų, kurie gali būti naudingi virškinamajam traktui. Cholinai padeda palaikyti normalią kepenų veiklą ir padeda palaikyti normalią homocisteino ir lipidų apykaitą.

Sudedamosios dalys: geriamasis vanduo, fruktozė, cholinai (cholino dihidro citratas), paprastųjų kiaušienių šaknų (lot. *Taraxacum officinale*) sausasis ekstraktas (kuriame yra 2 % inulino), inozitolis, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (natrio hidroksidas), daržovinių artiškų (lot. *Gynura scolymus* L.) lapų sausasis ekstraktas, konservantas (natrio benzoatas), saldiklis (sukralozė).

Vartojimas: paketėlio turinį galima vartoti neskiestą arba praskiestą 100 ml (pusė stiklinės) geriamąjo vandens. Vartoti 20 min. prieš valgį. Rekomenduojama vartojimo trukmė 2–4 savaitės.

Rekomenduojama vartojimo dozė:

- vaikams nuo 12 metų – 1 paketėlis vieną kartą per dieną;
- paaugliams nuo 14 metų ir suaugusiems po 1 paketėlį 2 kartus per dieną.

Aktyviosios medžiagos:	1 paketėlyje (10 ml)	2 paketėliuose (20 ml)
Cholino dihidro citratas, kuriame:	714,3 mg	1 428,6 mg
cholinai	250 mg	500 mg
Paprastųjų kiaušienių šaknų sausasis ekstraktas, kuriame:	300 mg	600 mg
inulinas	6 mg	12 mg
Inozitolis	250 mg	500 mg
Daržovinių artiškų lapų sausasis ekstraktas	50 mg	100 mg

Vartojimo apribojimai: nevartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, *neščioms ar krūtimi maitinančioms moterims*, taip pat jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai šio maisto papildu sudedamajai daliai. Nevartoti sergant tulžies pūsles, tulžies takų, šlapimo takų, kepenų, inkstų ligomis, cukriniu diabetu, širdies nepakankamumu ir virškinamojo trakto opomis.

Įspėjimai: nevirsyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Laikymas: laikyti originalioje pakuotėje, sausoje, tamsioje vietoje, nuo +8 °C iki +25 °C temperatūroje. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje! Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui (nurodytas ant pakuotės po «Geriausias iki (pabaigos):»).

Gamintojas: Farmaflor s.r.l., Via Donatori di Sangue 9, 12026 Piasco (CN), Italija.

Platintojas: SIA Vorwarts Pharma, Krīšjāņa Barona iela 15, Rīga, LV-1011, Latvija.

Aknasit®

Тойдүлүсүнд сүхкүрү жана магусайнега

200 мл

20 котикест а 10 мл

Aknasit® sisaldab aineid, mis aitavad kaasa normaalsele makstalitlusele.

Artiškõk aitab toetada seedimist ning soodustab maksa ja soolestiku normaalset talitlust. Võilille juur aitab kaasa seedetrakti ja maksa normaalsele talitlusele ning on prebiootiliste omadustega, mis on kasulik seedetraktile.

Koliin aitab säilitada normaalset maksa talitlust ning aitab kaasa normaalsele homotsüsteiini ja lipiidide ainevahetusele.

Koostisosad: vesi, fruktoos, koliin (koliindivesiniktsitraat), võilille (*Taraxacum officinale*) juure kuivekstrakt (sisaldab 2% inuliini), inositol, happesuse regulaator (naatriumhüdroksiid), artiškõki (*Cynara scolymus* L.) lehtede kuivekstrakt, säilitusaine (naatriumbensoaat), magusaine (sukraloos).

Kasutusjuhend: kotikese sisu võib võtta puhtalt või lahjendatult 100 ml (pool klaasi) joogivees 20 minutit enne sööki. Soovitatav kasutusaeg on 2–4 nädalat.

Soovitatav annus:

- lapsed alates 12. eluaastast – 1 kotike päevas;
- 14-aastased noorukid ja täiskasvanud – 1 kotike 2 korda päevas.

Soovitatav päevane annus sisaldab:	1 kotike (10 ml)	2 kotikest (20 ml)
Koliindivesiniktsitraat, mis sisaldab:	714,3 mg	1 428,6 mg
koliin	250 mg	500 mg
Võilillejuure kuivekstrakt, mis sisaldab:	300 mg	600 mg
inuliin	6 mg	12 mg
Inositol	250 mg	500 mg
Artišoki lehe kuivekstrakt	50 mg	100 mg

Kasutuspiirangud: ei sobi kasutamiseks alla 12-aastastele lastele, *naiste raseduse ja imetamise ajal*, samuti juhul, kui esineb ülitundlikkus selle toidulisandi mõne koostisosa suhtes. Ärge kasutage sapipõie, sapiteede, maksa- või neeruhaiguste, suhkurtõve, südamepuudulikkuse või seedetrakti haavandite korral.

Hoiatused: mitte ületada päevaseks tarbimiseks soovitatavat kogust! Toidulisandit mitte kasutada mitmekesise toidu asendajana. Oluline on mitmekülgne ja tasakaalustatud toitumine ning tervislik elustiil.

Säilitamine: hoida originaalpakendis, kuivas, pimedas kohas, temperatuuril +8 °C kuni +25 °C. Hoida laste kätesaamatus kohas! Mitte kasutada pärast säilivusaja lõppu (märgitud pakendil pärast «Parim enne lõppu:»).

Tootja: Farmaflor s.r.l., Via Donatori di Sangue 9, 12026 Piasco (CN), Itaalia.

Turustaja: SIA Vorwarts Pharma, Krīšjāņa Barona iela 15, Rīga, LV-1011, Lāti.

Aknasit®

Биологически активная добавка с сахаром и подсластителем

200 мл

20 стиков по 10 мл

Aknasit® – продукт, содержащий вещества, которые помогают обеспечить нормальную работу печени.

Содержащийся в составе артишок помогает поддерживать пищеварение, способствует нормальной работе печени и желудочно-кишечного тракта. Корень одуванчика способствует нормальной работе желудка и печени, обладает пребиотическими свойствами, которые благоприятно влияют на желудочно-кишечный тракт. Холин способствует поддержанию нормальной функции печени, а также обеспечению нормального метаболизма гомоцистеина и липидов.

Состав: вода, фруктоза, холин (холин дигидроген цитрат), сухой экстракт корня одуванчика (*Taraxacum officinale* Web) (содержит 2% инулина), инозитол, регулятор кислотности (гидроксид натрия), сухой экстракт листьев артишока (*Cynara scolymus* L.), консервант (бензоат натрия), подсластитель (сукралоза).

Применение: содержимое стика можно использовать в чистом виде или разведенным в 100 мл (полстакана) питьевой воды и принимать за 20 минут до еды. Рекомендуемая продолжительность применения составляет 2–4 недели.

Рекомендуемая дозировка:

- детям с 12 лет – 1 стик 1 раз в день;
- подросткам с 14 лет и взрослым – 1 стик 2 раза в день.

Рекомендуемая суточная доза содержит:	1 стик (10 мл)	2 стика (20 мл)
Холина дигидроген цитрат, который содержит:	714,3 мг	1 428,6 мг
холин	250 мг	500 мг
Сухой экстракт корня одуванчика, который содержит:	300 мг	600 мг
инулин	6 мг	12 мг
Инозитол	250 мг	500 мг
Сухой экстракт листьев артишока	50 мг	100 мг

Противопоказания: дети до 12 лет, повышенная чувствительность к любому из компонентов биологически активной добавки, *женщины в период беременности и лактации*, желчнокаменная болезнь, заболевания печени, непроходимость желчных путей, почечная недостаточность, острые заболевания почек, обструкция мочевыводящих путей, сахарный диабет, сердечная недостаточность, активная язвенная болезнь.

Предупреждения: не превышайте рекомендуемую суточную дозу. Не используйте биологически активную добавку вместо полноценного и сбалансированного питания.

Хранение: хранить в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света месте при температуре от +8°C до +25°C. Хранить в недоступном для детей месте! Не использовать после истечения срока годности (указанного на упаковке после «leiteicams līdz beigām:»).

Производитель: Farmaflor s.r.l., Via Donatori di Sangue 9, 12026 Piasco (CN), Италия.

Распространитель: SIA Vorwarts Pharma, Krīšjāņa Barona iela 15, Rīga, LV-1011, Латвия.