

Uztura bagātinātājs

BETARGIN®

L-arginīna un betaina komplekss

100 ml (10 paciņas pa 10 ml) / 200 ml (20 paciņas pa 10 ml)

10 ml (ieteicamā diennakts deva) satur:
L-arginīnu – 1000 mg, betainu – 500 mg.

Sastāvdaļas: ūdens, cukurs, L-arginīns, skābuma regulētājs – citronskābe, betains, vīnogu aromatizētājs, konservants – kālija sorbāts.

Betains palīdz nodrošināt normālu homocisteīna vielmaiņu. Norādīto labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 1,5 g betaina. Tomēr vairāk nekā 4 g uzņemšana katru dienu var ievērojami paaugstināt holesterīna līmeni asinīs.

Lietošana: pieaugušajiem 1 paciņas saturu izšķīdināt ½ glāzē istabas temperatūras dzeramā ūdens (100 ml) un lietot 1 reizi dienā no rīta pēc ēšanas.

Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu. Neizmantojot uztura bagātinātāju pilnvērtīgu un sabalansētu uztura aizvietošanai. Uzglabāt istabas temperatūrā (ne augstākā kā +25 °C). Glabāt bērniem nepieejamā vietā!

Ražotājs: Farmaflor s.r.l., Via Donatori di Sangue 9, 12026 Piasco (CN), Itālija.

Izplatītājs: SIA Vorwarts Pharma, Krišjāņa Barona iela 15, Rīga, LV-1011, Latvija.

Maisto papildas

BETARGIN®

L-arginīno ir betaino komplekss

100 ml (10 pakeliņ po 10 ml) / 200 ml (20 pakeliņ po 10 ml)

10 ml (rekomenduojamā paros dozē) yra:
L-arginīno – 1000 mg, betaino – 500 mg.

Sudedamosios dalys: geriamasis vanduo, cukrus, L-argininas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga – citrinų rūgštis, betainas, vynuogių kvapioji medžiaga, konservantas – kalio sorbatas.

Betainas padeda palaikyti normalią homocisteino apykaitą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 1,5 g betaino. Per parą suvartojant daugiau kaip 4 g betaino, gali gerokai padidėti cholesterolio koncentracija kraujyje.

Vartojimas: suaugusiesiems 1 pakelio turinį supilti į ½ stiklinės kambario temperatūros geriamojo vandens (100 ml) ir vartoti vieną kartą per dieną ryte po valgio.

Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Laikyti kambario temperatūroje (ne aukštesnėje kaip +25 °C temperatūroje). Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje!

Gamintojas: Farmaflor s.r.l., Via Donatori di Sangue 9, 12026 Piasco (CN), Itālija.

Platintojas: SIA Vorwarts Pharma, Krišjāņa Barona iela 15, Rīga, LV-1011, Latvija.

Toidulisand

BETARGIN®

L-arginiini ja betaiini kompleks

100 ml (10 kotikest à 10 ml) / 200 ml (20 kotikest à 10 ml)

10 ml (soovitav ööpäevane annus) sisaldab:
L-arginiini – 1000 mg, betaiini – 500 mg.

Koostisosad: joogivesi, suhkur, L-arginiin, happesuse regulaator - sidrunhape, betaiin, viinamarja lõhna- ja maitseaine, säilitusaine - kaaliumsorbaat.

Betaiin aitab kaasa homotsüsteiini normaalsele ainevahetusele. Kasulik toime avaldub, kui päevas tarbitakse 1,5 g betaiini. Päevas üle 4 g manustamisel võib vere kolesterooli tase märkimisväärselt tõusta.

Kasutamine: täiskasvanutele, valage 1 kotikese sisu ½ klaasi toasooja joogivette (100 ml). Võtke üks kord päevas, hommikul pärast sööki.

Mitte ületada päevaseks tarbimiseks soovitatavat kogust. Mitte kasutada toidulisandit mitmekesise toitumise asendajana. Oluline on mitmekesine ja tasakaalustatud toitumine ning tervislik eluviis. Säilitada toatemperatuuril (mitte üle +25 °C). Hoida lastele varjatud ja kättesaamatus kohas!

Tootja: Farmaflor s.r.l., Via Donatori di Sangue 9, 12026 Piasco (CN), Itaalia.

Turustaja: SIA Vorwarts Pharma, Krišjāņa Barona iela 15, Rīga, LV-1011, Lāti.

Биологически активная добавка

BETARGIN®

комплекс L-аргинина и бетаина

100 мл (10 стиков по 10 мл) / 200 мл (20 стиков по 10 мл)

10 мл (суточная доза) содержит: L-аргинин – 1000 мг, бетаин – 500 мг.

Состав: вода, сахар, L-аргинин, лимонная кислота (регулятор кислотности), бетаин, ароматизатор виноградный, сорбат калия (консервант).

Бетаин помогает обеспечить нормальный обмен гомоцистеина. Указанный благоприятный эффект достигается при приеме 1,5 г бетаина в день. Однако прием более чем 4 г бетаина в день может значительно повысить уровень холестерина в крови. Важно соблюдать здоровый образ жизни и питаться полноценно и сбалансированно.

Использование: взрослым растворить содержимое 1 стика в ½ стакана питьевой воды комнатной температуры (100 мл) и принимать 1 раз в день утром после еды.

Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Не используйте биологически активную добавку вместо полноценного и сбалансированного питания. Хранить при комнатной температуре (не выше +25 °C) в недоступном для детей месте.

Производитель: Farmaflor s.r.l., Via Donatori di Sangue 9, 12026 Piasco (CN), Италия.

Распространитель: SIA Vorwarts Pharma, Krišjāņa Barona iela 15, Rīga, LV-1011, Латвия.

www.vorwartspharma.lv