

Uztura bagātinātājs

EPIWELL

Suspensija iekšķīgai lietošanai

EpiCor® sausā rauga fermentāts, C, D vitamīni un cinks

EPIWELL sastāvā esošie C un D vitamīni un cinks atbalsta organisma dabiskās aizsargspējas. C vitamīns un cinks veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. Turklāt, sastāvā esošais C vitamīns veicina normālu enerģijas ieguves vielmaiņu un palīdz mazināt nogurumu un nespēku, kas īpaši pastiprinās saaukstēšanās laikā.

EpiCor® ir sastāvdaļa, kas iegūta, fermentējot *Saccharomyces cerevisiae* raugu.

Imūnsistēmas darbības normalizēšana ir īpaši aktuāla sezonālo risku laikā: vīrusu infekciju sastopamības periodos. Kā arī ziedēšanas laikā cilvēkiem, kuriem ir tendence uz sezonālām reakcijām uz augu ziedputekšņiem.

Sastāvdaļas: ūdens, cukurs, sausais *Saccharomyces cerevisiae* raugu fermentāts «EpiCor®», C vitamīns NUTRA-C™ (kalcijs L-askorbāts, magnijs L-askorbāts), aromatizētājs «meža ogas», skābuma regulētājs – citronskābe, cinka glikonāts, biezinātājs – ksantāna sveķi, konservants – kālija sorbāts, holekalciferols (D vitamīns).

Lietošana:

- bērni vecumā no 4 gadiem – 5 ml;
- bērni vecumā no 9 gadiem – 10 ml;
- pusaudži no 14 gadu vecuma un pieaugušie – 15 ml.

Lietot iekšķīgi vienu reizi dienā neatkarīgi no ēdienreizēm. Pirms katras lietošanas kārtīgi sakratiet pudeli. Lietojiet pievienoto mērglāzīti. Ieteicamais lietošanas ilgums – 24 dienas.

Lietošanas ierobežojumi: paaugstināta jutība pret kādu no šī uztura bagātinātāja sastāvdaļām, bērni līdz 4 gadu vecumam, grūtniecība un krūts barošanas periods. Satur cukuru, lietot piesardzīgi pacientiem ar cukura diabētu.

Bridinājumi: nepārsniedz ieteicamo diennakts devu. Neizmantojiet uztura bagātinātāju pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietošanai. Ir būtiski lietot pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Uzglabāšana: uzglabāt tumšā vietā, istabas temperatūrā, arī pēc atvēršanas (no +15°C līdz +25°C), telpās ar relatīvo gaisa mitrumu ne augstāku par 60%. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā! Pēc pudeles atvēršanas tās saturu izlietot 30 dienu laikā. Pēc katras lietošanas pudeli cieši aizvērt. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām (norādīts uz iepakojuma pēc vārdiem «Ieteicams līdz beigām»).

EpiCor® ir Cargill, Inc. reģistrēta preču zīme.

NUTRA-C™ ir Novotech Nutraceuticals, Inc. (USA) reģistrēta preču zīme.

Ieteicamā diennakts deva satur:	5 ml	10 ml	15 ml
Sauso <i>Saccharomyces cerevisiae</i> raugu fermentātu	90 mg	180 mg	270 mg
C vitamīnu	25 mg (31%*)	50 mg (63%*)	75 mg (94%*)
D vitamīnu	5 µg (100%*)	10 µg (200%*)	15 µg (300%*)
Cinku	2,5 mg (25%*)	5 mg (50%*)	7,5 mg (75%*)

* – % no uzturvielu atsauces vērtības

Ražotājs / Gamintojas / Tootja: ErgoPharma d.o.o., Gaji 1, Trnovlje pri Celju, 3000 Celje, priekš / pagal uzsakyma / for PharmaLinea d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenija / Sloveenia.

Izplatītājs / Platintojas / Turustaja: SIA Vorwarts Pharma, Krīšjāņa Barona iela 15, Rīga, LV-1011, Latvija / Latvija / Lāti.

www.vorwartspharma.lv

Maisto papildas

EPIWELL

Geriamoji suspensija skystis

EpiCor® dzīvintu mieliu fermentāts, vitamīns C, vitamīns D ir cinks.

Vitamīns C, vitamīns D ir cinks palīdz palaiķyti normāliu imūnīnē sistēmos veiklā.

Vitamīns C ir cinks palīdz apsaugoti lāstēles nuo oksidacīnē paķaidos.

Vitamīns C palīdz palaiķyti normāliu enerģijos apyķaitā.

Vitamīns C palīdz maķinti pavargimo ļausmā ir nuovargi, which are especially intensified during the season of colds

EpiCor® ļra sudedamoķi dalis, ļaunama fermentuļojant *Saccharomyces cerevisiae* mieles.

Imūnīnē sistēmos veiklos normalizavimas ļra ļpaķ svarbus

sezoniņu rīķīķu ļaikotarpīu – vīrusīņu infekcijū pīķo metu. ļaip pat ļķmonēms, ļinkusiēms ī sezoniēns reakcijās augalū ķīedadulķķms ķyķēķimo sezono metu.

Sudedamosios dalys: vanduo, cukrus, dķiovīntū mieliu *Saccharomyces cerevisiae* fermentatās «EpiCor®», vitamīns C «NUTRA-C™» (ķalcio L-askorbatas, magno L-askorbatas), ķvapiķi mišķo uoķū medķziķa, rūķķtingumā reguliuķojanti medķziķa (citriņ rūķķtis), cīķno gliukonatas, tīrķtiklis (ķsantano derva), ķonservantas (ķalio sorbatas), ķholeķalciferolis (vitamīns D).

Vartojimo nurodymai:

- vaikams nuo 4 metų - 5 ml;
- vaikams nuo 9 metų - 10 ml;
- suaugusiems ir vyresniems nei 14 metų vaikams - 15 ml.

Vartojimas: vartokite per burną dienos metu, nepriklausomai nuo suvartojamo maisto kiekio. Prieš kiekvieną vartojimą, buteliuką suplakite. Naudokite pridedamą matavimo taurelę. Rekomenduojama vartojimo trukmė 24 dienos.

Vartojimo apribojimai: žmonėms, netoleruojantiems tam tikrų sudedamųjų dalių, jaunesniems kaip 4 metų vaikams, nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Sudėtyje yra cukraus, atsargiai vartoti sergantys cukriniu diabetu.

Išpėjimai: Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Laikymas: laikyti nuo šviesos apsaugotoje vietoje, kambario temperatūroje, taip pat ir po atidarymo (nuo +15 °C iki +25 °C),

patalpose, kuriose santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 60 %. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamose vietoje! Po pirmojo atidarymo buteliuko turinį sunaudokite per 30 dienų. Po kiekvieno naudojimo buteliuką sandariai uždarykite. Nenaudokite pasibaigus tinkamumo vartoti laikui (nurodyta ant pakuotės po «Geriausias iki (pabaigos):»).

EpiCor® – registruotas «Cargill, Inc.» prekės ženklas.

Nutra-C™ – «Novotech Nutraceuticals, Inc. (USA)» prekės ženklas.

Aktyviosios medžiagos	5 ml	10 ml	15 ml
Džiovintų mielių <i>Saccharomyces cerevisiae</i> fermentatas	90 mg	180 mg	270 mg
Vitaminas C	25 mg (31%*)	50 mg (63%*)	75 mg (94%*)
Vitaminas D	5 µg (100%*)	10 µg (200%*)	15 µg (300%*)
Cinkas	2,5 mg (25%*)	5 mg (50%*)	7,5 mg (75%*)

* – % referencinės maistinės vertės

Toidulisand EPIWELL

Suspensioon sukaudseks kasutamiseks

EpiCor® kuivpärmi fermentaat, C- ja D-vitamiin ning tsink

EPIWELL'is sisalduvud **C-, D-vitamiin** ja **tsink** aitavad **kaasa** imuunsüsteemi normaalsele talitlusele. **Vitamiin C** ja **tsink** aitavad kaitsta rakke oksidatiivse stressi eest. Lisaks aitab koostises olev **vitamiin C** kaasa normaalsele energivahetusele ja aitab vähendada väsimust ning kurnatust, mis on eriti suurenenud külmetushooaegadel.

EpiCor® on koostisosa, mis on saadud pärmi *Saccharomyces cerevisiae* kääritamis.

Imuunsüsteemi normaalse toimimine on kõige olulisem hooajaliste riskide perioodil: viirusnakkuste esinemise tipperioodidel. Samuti öitsemise ajal inimestel, kes on vastuvõtlikud hooajalistele reaktsioonidele öietolmu suhtes.

Koostisosad: vesi, suhkur, «EpiCor®» kuivpärmi *Saccharomyces cerevisiae* fermentaat, **vitamiin C** NUTRA-C™ (kaltsium-L-askorbaat, magneesium-L-askorbaat), metsamarja lõhna- ja maitseaine, happesuse regulaator – sidrunhape, tsinglükonaat, paksendaja – ksantaankummi, säilitusaine – kaaliumsorbaat, kolekaltsiferool.

Kasutusjuhend:

- lastele alates 4. eluaastast – 5 ml;
- lastele alates 9. eluaastast – 10 ml;
- täiskasvanutele ja üle 14-aastastele lastele – 15 ml.

Manustage suu kaudu päeva jooksul, olenemata toidu tarbimisest. Raputage pudelit enne iga annust. Kasutage kaasasolevat mõõtetopsi. Soovitatav kasutusaeg on 24 päeva.

Kasutuspiirangud: inimesed, kellel on teatud koostisainete talumatus, alla 4-aastased lapsed, rasedus ja imetamine. Sisaldab suhkrut, diabeediga patsiendid peavad kasutama ettevaatusega.

Hoiatused: mitte ületada päevaseks tarbimiseks soovitatavat kogust. Mitte kasutada toidulisandit mitmekesise toitumise asendajana. Oluline on mitmekesine ja tasakaalustatud toitumine ning tervislik eluviis.

Säilitamistingimused: hoida toatemperatuuril, valguse eest kaitstult. Pärast avamist (+15 °C kuni +25 °C), ruumides, mille suhteline õhuniiskus ei ületa 60%. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Pärast esmast avamist kasutage pudeli sisu ära 30 päeva jooksul. Pärast iga kasutamist sulgege pudel tihedalt. Ärge kasutage pärast säilivusaja lõppu (märgitud pakendil pärast «Parim enne»).

EpiCor® – Cargill, Inc. registreeritud kaubamärk.

Nutra-C™ – Novotech Nutraceuticals, Inc. (USA) kaubamärk.

Soovituslik päevane kogus sisaldab:	5 ml	10 ml	15 ml
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> kuivpärmi fermentaat	90 mg	180 mg	270 mg
Vitamiin C	25 mg (31%*)	50 mg (63%*)	75 mg (94%*)
Vitamiin D	5 µg (100%*)	10 µg (200%*)	15 µg (300%*)
Tsink	2,5 mg (25%*)	5 mg (50%*)	7,5 mg (75%*)

* – % päevasest võrdluskogusest täiskasvanutele



120 ml

ORWARTS
V_P PHARMA