

Lactamil®

Uztura bagātinātājs
15 ml

Dabīgs laktāzes enzīms

Zīdaiņu pilieni Lactamil® ir laktāzes fermenta avots. Pilienu lieto bērniem no dzimšanas brīža līdz 12 mēnešu vecumam gan zīdīšanas laikā, gan lietojot kopā ar laktozi saturošiem piena maisījumiem zīdīniem.

Lactamil® aktīvā sastāvdaļa ir laktāzes enzīms, kas dabiski rodas organismā.

Laktāze ir galvenā enerģētiskā un strukturālā daļa no krūts piena vai jebkura cita laktozi saturoša piena maisījuma zīdaiņiem. Laktāze ir galvenais ogļhidrātu zīdaiņu uzturā. Lai piena uzsūktos bērna organismā, tas tiek sašķelts ar speciālu fermentu – laktāzi. Laktāzes daudzums zīdaiņu zarnās var būt nepietiekams, lai sašķeltu krūts pienu vai piena maisījumus. Lactamil® ir laktāzes fermenta papildu avots.

Sastāvdaļas: laktāze, nesējiela glicerīns. 72 pilieni satur 16200 ALU jeb 3.6 ml.

Lietošana: pilienu Lactamil® lieto katrā barošanas reizē no dzimšanas līdz 12 mēnešu vecumam saskaņā ar dozēšanas tabulu. Nedot vairāk par 72 pilieniem 24 stundu periodā.

Kā pareizi lietot Lactamil®? Lactamil® lieto katrā barošanas reizē.

Zīdīšanas laika:

- ievērojot dozēšanas tabulu, uz iepriekš sterilizētas karotes uzpildināt atbilstošu Lactamil® pilienu skaitu un iedot zīdaiņim pirms katras barošanas.

Barojot ar piena maisījumiem:

- sagatavot piena maisījumu zīdaiņiem saskaņā ar ražotāja norādījumiem;
- ievērojot dozēšanas tabulu, pievienot Lactamil® pilienu pienam vai piena maisījumam.

Dozēšanas tabula

Vecums	Piena vai piena maisījuma daudzums vienai ēdienreizei (ml)	Pilienu skaits vienā ēdienreizē*	Laktāzes daudzums vienā ēdienreizē
0-2 nedēļas	60	3	675 ALU
3-4 nedēļas	120	4	900 ALU
1-2 mēneši	150	5	1125 ALU
3-4 mēneši	180	6	1350 ALU
5-6 mēneši	210	7	1575 ALU
7-12 mēneši	230	8	1800 ALU

* 1 pilieni satur 225 ALU

Nedot vairāk par 72 pilieniem 24 stundu periodā.

Kā pakāpeniski pārtraukt Lactamil® lietošanu? Mēs iesakām katrā barošanas reizē samazināt ieteicamo devu uz pusi vai pāriet uz Lactamil® lietošanu tikai katrā otrajā barošanas reizē. Ja zīdaiņim, pārtraucot lietot Lactamil®, diskomforts saglabājas vai atkārtojas, ieteicams atgriezties pie sākotnējā lietošanas režīma.

Piezīmes: tā kā Lactamil® satur dabīgu fermentu, kas tiek deaktivēts karstuma ietekmē, pilienu nevajadzētu pievienot karstam vai ļoti aukstam pienam/piena maisījumam.

Ierobežojumi: individuāla produktā esošo sastāvdaļu nepanesība.

Brīdinājumi: nepārsniegt ieteicamo diennakts devu. Neizmantojot uztura bagātinātāju pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietošanai.

Uzglabāšana un derīguma termiņš: uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, sausā un tumšā vietā, kas nav pieejama bērniem, temperatūrā, kas nepārsniedz 25°C! Pilieni ir derīgi lietošanai trīs nedēļas pēc pudeles pirmās atvēršanas. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām (norādīts uz iepakojuma pēc vārdiem «Ieteicams līdz beigām»).

Ražotājs: Farmaflor s.r.l., Via Donatori di Sangue 9, 12026 Piasco (CN), Itālija.

Izplatītājs: SIA Vorwarts Pharma, Krīšjāņa Barona iela 15, Rīga, LV-1011, Latvija.

Lactamil®

Maisto papilds
15 ml

Natūralus laktāzes fermentus

Laša kūdikiams Lactamil® yra laktāzes fermento šaltinis. Lašai vartojami vaikai nuo gimimo iki 12 mėnesių amžiaus, tiek žindyamo metu, tiek kartu su laktāzes turinčiais pieno mišiniais kūdikiams. Veiklioji Lactamil® medžiaga yra laktāzes fermentas, kuris natūraliai gaminamas organizme.

Laktāze yra pagrindinė energinė ir struktūrinė motinos pieno ar bet kurio kito laktāzes turinčio mišinio, skirto kūdikiams, sudedamoji dalis. Laktāzė yra pagrindinis angliavandenis kūdikių racione. Kad pieną pasisavintų vaiko organizmas, jį skaido specialus fermentas – laktāzė. Kūdikių žarnyne esančios laktāzės kiekio gali nepakakti motinos pienui ar pieno mišiniui suskaidyti. Lactamil® yra papildomas laktāzes fermento šaltinis.

Sudedamosios dalys: laktāzė, nešikis glicerolis. 72 lašeliuose yra 16200 ALU arba 3.6 ml.

Vartojimas: Lactamil® lašai vartojami kiekvieno maitinimo metu nuo gimimo iki 12 mėnesių amžiaus pagal dozavimo lentelę. Nevartokite daugiau kaip 72 lašus per 24 valandas.

Kaip tinkamai vartoti Lactamil®? Lactamil® vartojamas kiekvieno maitinimo metu.

Žindant:

- pagal dozavimo lentelę užlašinkite atitinkamą Lactamil® lašų skaičių ant iš anksto sterilizuoto šaukštelio ir duokite kūdikiui prieš kiekvieną maitinimą.

Kai maitinate pieno mišiniais:

- paruoškite pieno mišinį kūdikiams pagal gamintojo nurodymus;
- vaдовaudamiesi dozavimo lentele, Lactamil® lašus įlašinkite į pieną arba pieno mišinį.

Dozavimo lentelė

Amžius	Pieno arba pieno mišinio kiekis vieno valgymo metu (ml)	Lašų skaičius vieno valgymo metu*	Laktāzės kiekis vieno valgymo metu
0-2 savaitės	60	3	675 ALU
3-4 savaitės	120	4	900 ALU
1-2 mėnesiai	150	5	1125 ALU
3-4 mėnesiai	180	6	1350 ALU
5-6 mėnesiai	210	7	1575 ALU
7-12 mėnesiai	230	8	1800 ALU

* 1 laše yra 225 ALU

Nevartokite daugiau kaip 72 lašus per 24 valandas.

Kaip palaipsniui nutraukti Lactamil® lietojimą? Mes rekomenduojame perpus sumažinti rekomenduojamą dozę kiekvieno maitinimo metu arba pereiti prie Lactamil® vartojimo tik kas antrą maitinimą. Jei nustojus vartoti Lactamil® kūdikiui diskomfortas išlieka arba kartojasi, rekomenduojama grįžti prie pradinio vartojimo režimo.

Pastabos: Lactamil® sudėtyje yra natūralaus fermento, kuris deaktyvuojamas veikiant karščiui, lašų negalima pilti į karštą arba labai šaltą pieną/pieno mišinį.

Apribojimai: individualus netoleravimas produkto sudedamosioms dalims.

Išpėjimai: neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip pakeičiamas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Laikymo ir galiojimo laikas: laikyti originalioje pakuotėje, sausoje ir tamsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje! Lašai tinkami vartoti tris savaites po pirmojo buteliuko atidarymo. Nevartoti pasibaigus tinkamumo vartoti terminui (nurodytas ant pakuotės po užrašo «Geriausias iki (pabaigos)»).

Gamintojas: Farmaflor s.r.l., Via Donatori di Sangue 9, 12026 Piasco (CN), Italija.

Platintojas: SIA Vorwarts Pharma, Krīšjāņa Barona iela 15, Rīga, LV-1011, Latvija.

Lactamil®

Toidulisand
15 ml

Looduslik laktaasi ensüüm

Tilgakased imikutele Lactamil® on laktaasi ensüümi allikaks. Tilgakased on mõeldud lastele alates sünnihetkest kuni 12 kuu vanuseni nii imetamise ajal kui ka tarvitamiseks koos imikutele mõeldud, laktoosi sisaldavate piimasegudega.

Lactamil® aktiivseks koostisosaks on laktaasi ensüüm, mis tekib organismis loomulikult teel.

Laktoos on rinnapiima või igasuguse muu, imikutele mõeldud piimasegu, peamiseks energiaallikaks ja struktuurseks osaks. Laktoos on peamiseks süsivesikuks imikute toidus. Selleks, et piim imenduks lapse organismi, lõhustatakse see spetsiaalse ensüümi – laktaasi abil. Imikute sooltes olev laktaasikogus võib olla ebaapiisv rinnapiima või piimasegude lõhustamiseks. Lactamil® on täiendavaks laktaasi ensüümi allikaks.

Koostisosad: laktaas, kandeaine glütseriin. 72 tilgakest sisaldavad 16200 ALU ehk 3.6 ml.

Kasutamine: Lactamil® tilgakesi kasutatakse iga toitmiskorral alates sündimisest kuni 12 kuu vanuseni, vastavalt doseerimistabelile. 24 tunnise perioodi jooksul ärge andke üle 72 tilga.

Kuidas Lactamil® õigesti tarvitada? Lactamil® tarvitatakse iga toitmiskorral.

Imetamise ajal:

- doseerimistabelit järgides, tilgutage eelnevalt steriliseeritud lusikale vastav hulk Lactamil® tilkaid ja andke imikule enne iga toitmist.

Piimasegudega toitmisel:

- valmistage imikutele piimasegu vastavalt tootja juhisteile;
- doseerimistabelit järgides, lisage Lactamil® tilgad piimale või piimasegule.

Doseerimistabel

Vanus	Piima või piimasegu kogus üheks söögikorraks (ml)	Tilkade hulk ühel söögikorral*	Laktaasikogus ühel söögikorral
0-2 nädalat	60	3	675 ALU
3-4 nädalat	120	4	900 ALU
1-2 kuud	150	5	1125 ALU
3-4 kuud	180	6	1350 ALU
5-6 kuud	210	7	1575 ALU
7-12 kuud	230	8	1800 ALU

* 1 tilk sisaldab 225 ALU

24 tunnise perioodi jooksul ärge andke üle 72 tilga.

Kuidas Lactamil® tarvitamine järkjärgult katkestada?

Meie soovime iga toitmiskorral vähendada soovitatavat annust poole võrra või minna üle Lactamil® tarvitamisele vaid iga teisel toitmiskorral. Juhul kui Lactamil® tarvitamise katkestamisel imikul ebaumagavustunne säilib või kordub, on soovitatav pöörduda tagasi esialgse tarvitamisrežiimi juurde.

Märkused: kuna Lactamil® sisaldab looduslikku ensüümi, mis kuumuse toimel desaktiveeritakse, ei tihagi tilkakesi lisada kuumale või väga külmale piimale/piimasegule.

Piirangud: tootes sisalduvate koostisosade individuaalne talumatus.

Hoiatused: mitte ületada soovitatavat ööpäevast annust. Mitte kasutada toidulisandit täisväärtuslikuks ja tasakaalustatud toitumise asendamiseks.

Säilitamine ja säilivusaeg: säilitada originaalpakendis, kuivas ja pimedas, lastele kättesaamatus kohas, temperatuuril, mis ei ületa 25°C! Tilgad on kõlbulikul kasutamiseks kolme nädala jooksul pärast pudeli esmakordset avamist. Pärast säilivusaja lõppu (näidatud pakendil pärast sõnu «Parim enne lõppu») mitte tarvitada.

Tootja: Farmafor s.r.l., Via Donatori di Sangue 9, 12026 Piasco (CN), Itaalia.

Turustaja: SIA Vorwarts Pharma, Krīšjāņa Barona iela 15, Rīga, LV-1011, Lāti.

Lactamil®

Биологически активная добавка
15 мл

Источник природного фермента лактазы

Детские капли Lactamil® – источник фермента лактазы. Капли используются для детей с момента рождения и до 12 месяцев как при грудном вскармливании, так и при использовании детских молочных смесей.

Активным ингредиентом Lactamil® является фермент лактаза, который присутствует в организме ребенка естественным образом.

Лактоза – это основная энергетическая и структурная часть грудного молока или любой детской молочной смеси, содержащей лактозу. Лактоза – углевод, который является главным в питании детей грудного возраста. Для того, чтобы молоко усвоилось организмом ребенка, оно должно расщепиться специальным ферментом – лактазой.

Кишечник у малышей может иметь недостаточное количество лактазы, чтобы расщепить грудное молоко или молочные смеси. Lactamil® является дополнительным источником фермента лактазы.

Состав: лактаза, глицерин (носитель). 72 капли содержат 16200 ALU, или 3.6 мл.

Применение: Lactamil® используется при каждом кормлении начиная с рождения до 12 месяцев в соответствии с таблицей дозировки. Не давайте более 72 капель в течение 24 часов.

Как правильно употреблять Lactamil®? Lactamil® используется при каждом кормлении.

При грудном вскармливании:

- следуя таблице дозировки, накапать соответствующее количество капель Lactamil® в предварительно стерилизованную ложку и давать младенцу перед каждым кормлением.

При кормлении молочными смесями:

- приготовить детскую молочную смесь в соответствии с инструкцией производителя;
- следуя таблице дозировки, добавить капли Lactamil® к молоку или молочной смеси.

Таблица дозировки

Возраст	Количество молока или молочной смеси на один прием пищи (мл)	Количество капель на один прием пищи*	Количество лактазы на один прием пищи
0-2 недели	60	3	675 ALU
3-4 недели	120	4	900 ALU
1-2 месяца	150	5	1125 ALU
3-4 месяца	180	6	1350 ALU
5-6 месяцев	210	7	1575 ALU
7-12 месяцев	230	8	1800 ALU

* 1 капля содержит 225 ALU

Не давайте более 72 капель в течение 24 часов.

Как постепенно отказаться от Lactamil®? Мы предлагаем уменьшать рекомендованную дозу вдвое при каждом кормлении или перейти на прием Lactamil® через одно кормление. Если в процессе отказа от Lactamil® у младенца дискомфорт не проходит или возвращается, рекомендуется вернуться к исходной схеме приема.

Примечания: поскольку в Lactamil® входит натуральный фермент, он деактивируется под воздействием высокой или низкой температуры, поэтому капли нельзя добавлять в горячие или холодное молоко/молочную смесь.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Предупреждения: не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не используйте биологически активную добавку вместо полноценного и сбалансированного питания.

Условия хранения и срок годности: хранить в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света и тепла месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте! Капли пригодны к использованию в течение трех недель после первого вскрытия бутылки. Не использовать после истечения срока годности (указанного на упаковке после «leiteicams līdz beigām» / Geriausias iki (pabaigos) / Parim enne lõppu:»).

Производитель: Farmafor s.r.l. Via Donatori di Sangue 9, 12026 Piasco (CN), Италия.

Распространитель: SIA Vorwarts Pharma, Krīšjāņa Barona iela 15, Rīga, LV-1011, Латвия.